

۱۰۰























# الزراعة

## المؤتمر الطبى البيطرى العربى يختتم أعماله اليوم ناقش المؤتمر تخصيص بعض الاراضى المستصلحة للحيوان الزراعى لأنه يكمل الإنتاج النباتى

كتب حسن سلامة :

بعد أن أعلن المؤتمر الطبى البيطرى العربى الثالث جلسته الختامية برئاسة الدكتور أمين زاهر رئيس المؤتمر .. وبعد أن أعلن الدكتور محمد طه فؤاد الأمين العام للمؤتمر توصياته على الدكتور زاهر بوصفه رئيسا للجمعية الطبية البيطرية المصرية كونه .. تمثيلا للدكتور أحمد مصطفى والمهندس سيد مرسى ..

وكان الرئيس جمال عبد الناصر قد قبل وزير الزراعة والإصلاح الزراعى الدكتور أمين زاهر رئيس المؤتمر الذى نظمه الجمعية بالتعاون مع وزارة البحث العلمى تحت إشراف الدكتور أحمد مصطفى وزير البحث العلمى والدكتور عبدالرازق مصطفى وزير الزراعة والحقائق المسندة لخدمة الأغذية والزراعة بالشرق الأوسط الدكتور محمود رشدى مستشار الشؤون البيطرية بجامعة الدول العربية والسيد سمعان محافظ القاهرة والدكتور أمين زاهر رئيس الجمعية البيطرية ووكيل وزارة الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية الدكتور حلى زكى مدير عام مصلحة الطب البيطرى وكبار رجال وزارة الزراعة والبحث العلمى وأساقفة كلية الطب البيطرى ..

### الوفود العربية

ومن الوفود العربية التى اشتركت في المؤتمر الكفارة كمال الطاهر ومحمى نسحة ( الأردن ) وعبد الباقى ومحمى زين العابدين ( الكويت ) ومحمى الدليل وسليح هادي وصالح مصطفى ( العراق ) وكثيرى ومحمى الجدة ( سوريا ) ومحمى الرفيعة ( المغرب ) ومحمى مصطفى ( السودان ) ومحمى شيمان مصطفى وأحمد زكى ابن لبنان ومحمى القصور ومحمى الطاهر الفول ومحمى الحبيب بياض ( ليبيا ) ومحمى الفراء الاحبابى فى الصحة الحيوانية وتحدثت الوفود العربية عن دور الطب البيطرى فى الزراعة كالاتى :  
١٤٥ جنيلا للطن من الياف الدرجة الأولى  
١٣٥ جنيلا للطن من الياف الدرجة الثانية  
١٢٥ جنيلا للطن من الياف الدرجة الثالثة  
وذلك تسليم مصنع الشركة بليبس ، ويتم الفيزو فى نفس يوم التوزيع

بالإضافة إلى عن اية بيانات إضافية أفضل :  
بالإدارة الزراعية للشركة ١٧ شارع قصر النيل بالقاهرة ٤٦٥/٥٦٧-٤٣٠

### وزارة الزراعة

#### ارشادات هامة لزراع السمسم استعمال التقاوى الجيدة والاسراع فى الزراعة

عاملان هامين للحصول على محصول وفير

- يهم وزارة الزراعة ان توضح للسادة زراعى السمسم ان اتباع الارشادات التالية تؤدى الى محصولهم على محصول وفير :-
- استعمال التقاوى المعصرة من صنف جيزة ٢٣ ابيض وجيزة ٢٤ ابيض وريز مطبوقة الجيزة ٢٥
- اختيار الاراضى الصغرى باوقاعها وجنب الطينة والحامية والفردة
- تسوية الارض تسوية جيدة ثم حططها بمعدل ٤ اخط فى القصبين والزراعة فى جور على بعد ٢٠ سم ثم اخط على نياتون فى الجورة
- اعطاء الارض رية كراتية قبل الزراعة لاختراقها ثم اخط على ان يراى الحرس فى الري بعد ذلك
- لتقضى ركة المياه باقل فيلتج من ذلك اصابة النباتات بمرض الذبول (السلك)
- من الأفضل الانتظار من الزراعة قبل منتصف مايو حيث يؤدى تأخيرها الى نقص المحصول
- تسديد القدرات بمعدل حوالى ثمانية بعد الحف
- الإدارة العامة للإرشاد الزراعى

### وزارة الزراعة

#### ارشادات هامة لزراع الفول السودانى استعمال التقاوى الجيدة والاسراع فى الزراعة عاملان هامين

للمحصول على محصول وفير

يهم وزارة الزراعة ان توضح للسادة زراعى الفول السودانى ان اتباع الارشادات التالية تؤدى الى محصولهم على محصول وفير :-


- استعمال التقاوى المعصرة من صنف جيزة ٣٣ ابيض وجيزة ٣٤ ابيض وريز مطبوقة الجيزة ٣٥
- تخطيط الارض بمعدل ١٢ اخط فى القصبين ويكون الزراعة فى جور على بعد ٢٠ سم مع وضع بذرة واحدة فى الجورة وتحتاج الفدان الى ٣٥ كجم من البذور
- معامل البذر قبل الزراعة مباشرة بالعقدريه
- عدم زراعة المحصول فى نفس الارض سنة بعد اخرى
- من الأفضل الانتظار من الزراعة قبل منتصف مايو حيث يؤدى تأخيرها الى نقص المحصول
- « الإدارة العامة للإرشاد الزراعى »



د. علي زكى مدير عام الطب البيطرى



د. محمد طه فؤاد الأمين العام للمؤتمر



د. عبد الباقى ومحمى زين العابدين



جانب من أعضاء الوفود العربية في المؤتمر

## «ارشادات كيميا» لزيادة محصولك من الذرة

الذرة الآتية ويوقف النمو السريع للنباتات في المراحل الاولى للنبات على توفر العناصر الغذائية اللازمة في تدارك جذورها ، وتستجيب الذرة لآثار بسرعة وتكثف النباتات اللون الأخضر الداكن والتي القوى بنينا بسبب نفس الآزوت ضف نموها محوبا وشعوب لونها ..

ولا يجب الانتظار حتى تظهر مثل هذه الاعراض حيث ان نقص المحصول وضف النقص يسبق ظهور مثل هذه الاعراض ببراهل وتؤدى التقنية الزراعية الصحيحة الى تكوين مجموع جذرى قوى وبالتالي زيادة اكبر على امتصاص العناصر الغذائية ويزرع سداد تقريبا ٢٦٪ اوتوكيشيا حول النباتات وعلى بعد ٥ سم من الجذور وهي اما ان تصاب على دفعة واحدة بعد الحف وقبل الحيايه او تنطى على دفعتين متساويتين الاولى في الجداد السابق والدفعة الثانية قبل الري الثانية ..



السداد الاصيل لجميع المحاصيل

شركة الصناعات الكيماوية المصرية

اصفى السداد الاصيل

واعضاء المؤتمر وقد توفقت امانة اقامة الجازز الالية واشرافا للمحافظة على الصحة العامة للجمهور والتأكد من خالية من الاراضى والاوية التى تفضل الانسان من طريق الحزم المذبحة ..

وطالب مدير عام الطب البيطرى ضرورة اقامة وتضمين الجازز الالية في جميع مواسم الاحتفالات حيث ان الجازز بوضعها الحالي تفضل خطرا كبيرا على الصحة العامة كما طالب اعضاء المؤتمر الاهتمام بتضمين الجازز الالية في جميع مواسم الاحتفالات حيث ان الجازز بوضعها الحالي تفضل خطرا كبيرا على الصحة العامة كما طالب اعضاء المؤتمر الاهتمام بتضمين الجازز الالية في جميع مواسم الاحتفالات حيث ان الجازز بوضعها الحالي تفضل خطرا كبيرا على الصحة العامة ..

زيارة الفيوم

ولم يبق اعضاء المؤتمر والوفود العربية يوما هذا في زيارة حافلة اليوم وزاروا جمعية بتمضمم في ربيع الماشية ومطلة تربية النواحي والمين البيطرى والوحدة البيطرية بدمياط الى بانية قدام وحب بهم انسدة على فوزى بونس محافظ الفيوم السابق ومحمى الطاهر سترى عام المحافظة والدكتور محمد طه عبد الله مدير عام الطب البيطرى بالفيوم والدكتور محمد زين الدين مدير عام الصحة البيطرية ونور تيريد مدير عام الاسلا - ابراهيم الفخرى رئيس محمود والتمتدرة نيزرة خمس .. وفى المساء عقدت ندوة علمية

مدير الطب البيطرى يسافر الى باريس غدا

يفكر القاهرة ( غدا ) الرياض

الدكتور حلى زكى مدير عام الطب البيطرى المسجلة البيطرية لشئون الجمهورية العربية المتحدة في جلسات المؤتمر الاولى للجنة الحيوانية الذى عقد في ١٢ - ١٨ مايو الحالى ..

## كيف تحصل على محصول وفير من الذرة؟

- ### التكبير فى الزراعة عامل هام فى زيادة الإنتاج
- ثبتت من التجارب والبحوث التى أجرتها وزارة الزراعة أن التكبير فى زراعة الذرة عامل هام فى زيادة الإنتاج لهذا تهيب الوزارة بالزراعى البدو فورا فى خدمة الأرض التى أخلت من المحاصيل الشتوية مع الإسراع فى إخمارة الأرض بمرور نضج المحاصيل الشتوية الأخرى لأن الخطوة الأولى فى الحصول على إنتاج وفير هى الزراعة البديرة والإرشادات التالية تؤدى عند اتباعها الى الحصول على محصول مرتفع فاحرص على تنفيذها تخدم نفسك ووطنك ..
- أخدم أرضك جيدا ثم حططها بمعدل ١٠ اخط فى القصبين وازرع فى الثلث الأسفل من الخط فى جور على بعد ٣٠ - ٣٥ سم
  - بادر بالحف على عود واحد قبل رية الحيايه
  - أضف السداد البلدى عند الحف وحرص على إضافة السداد الكيماوى المقرر كيكشا على دفعتين قبل رية الحيايه وقبل الري الثانية
  - راع أحكام الري وعدم تعطيش النباتات أو فربطها مع تقرب فترات الري عند ملء النباتات
  - فحص جزو من الأرض لزراعتها بالدراسة أو الزرة السكرية حتى لا تضطر للتوريع أو الرشوش أو إجراء الحف المتكرر لتغذية الماشية
  - العلاج الكيماوى للوقاية من الناقبات هو الوسيلة الفعالة لوقاية الذرة والري يتحكم إجمالا فى المواعيد التى يحددها الإخصاب نتيجة فحص حقلك النبؤ
- ### الإدارة العامة للإرشاد الزراعى

هكذا من التفضل











